


- 为了防止受到感染，皮肤受损后必须立即清洗，并包扎妥当。如有需要，应到医院求诊



- 个别行业的人员，可因应受感染的风险，寻求医生的专业意见，决定是否需要在入职前接受适当的防疫注射，例如乙型肝炎疫苗



- 当皮肤破损后，应听取医生意见，接受适当的防疫注射，例如破伤风疫苗

## 咨询服务：

电话：2852 4041

传真：2581 2049

电邮：enquiry@labour.gov.hk

你亦可透过互联网，找到劳工处提供的各项服务及主要劳工法例的资料。本处网址是：  
<http://www.labour.gov.hk>。

## 投诉热线：

如有任何有关不安全的工作环境及工序的投诉，请致电劳工处职安健投诉热线：2542 2172。







# 工作中的 皮肤损伤

工作时皮肤损伤虽然是常见的情况，但却经常被忽略。工作中不同的危害因素，可导致不同程度的皮肤损伤，严重的更会引发并发症，影响受伤员工的工作表现和生产力，因此，我们应尽力预防工作中的皮肤损伤，不能掉以轻心。

## 哪些员工应特别提防皮肤损伤？



## 皮肤损伤可引致：

-  伤口感染 — 引致伤口红肿、疼痛甚至化脓，严重的更可导致败血症
-  乙型肝炎 — 员工如被带有乙型肝炎病毒的血液或体液的利器刺伤，便有机会受感染
-  破伤风 — 常见于泥土里的破伤风杆菌可从伤口进入体内，情况严重时，可以致命
-  其他的感染 — 丙型肝炎和人类免疫力缺乏病毒感染亦可由被污染的利器引致的皮肤损伤传播。另外，一些可源于动物的病菌，如猪型链球菌、钩端螺旋体及布鲁氏杆菌等，可由伤口进入人体引起疾病

## 怎样预防？

- 评估在工作中受伤的风险，及制订所需的预防措施及指引
- 安排雇员接受工作安全的训练



- 在工作中必须使用适当的个人保护装备，例如在地盘里穿上合规格的安全鞋

- 制订呈报、调查、跟进及分析受伤个案的制度，以评估预防措施效用及作出所需的改善

