


- 為了防止受到感染，皮膚受損後必須立即清洗，並包紮妥當。如有需要，應到醫院求診



- 個別行業的人員，可因應受感染的風險，尋求醫生的專業意見，決定是否需要在入職前接受適當的防疫注射，例如乙型肝炎疫苗



- 當皮膚破損後，應聽取醫生意見，接受適當的防疫注射，例如破傷風疫苗

### 諮詢服務：

電話：2852 4041

傳真：2581 2049

電郵：enquiry@labour.gov.hk

你亦可透過互聯網，找到勞工處提供的各項服務及主要勞工法例的資料。本處網址是：  
<http://www.labour.gov.hk>。

### 投訴熱線：

如有任何有關不安全的工作環境及工序的投訴，請致電勞工處職安健投訴熱線：2542 2172。







# 工作中的 皮膚損傷

工作時皮膚損傷雖然是常見的情況，但卻經常被忽略。工作中不同的危害因素，可導致不同程度的皮膚損傷，嚴重的更會引發併發症，影響受傷員工的工作表現和生產力，因此，我們應盡力預防工作中的皮膚損傷，不能掉以輕心。

## 哪些員工應特別提防皮膚損傷？



## 皮膚損傷可引致：

-  傷口感染 — 引致傷口紅腫、疼痛甚至化膿，嚴重的更可導致敗血症
-  乙型肝炎 — 員工如被帶有乙型肝炎病毒的血液或體液的利器刺傷，便有機會受感染
-  破傷風 — 常見於泥土裏的破傷風桿菌可從傷口進入體內，情況嚴重時，可以致命
-  其他的感染 — 丙型肝炎和人類免疫力缺乏病毒感染亦可由被污染的利器引致的皮膚損傷傳播。另外，一些可源於動物的病菌，如豬型鏈球菌、鈎端螺旋體及布魯氏桿菌等，可由傷口進入人體引起疾病

## 怎樣預防？

- 評估在工作中受傷的風險，及制訂所需的預防措施及指引
- 安排僱員接受工作安全的訓練



- 在工作中必須使用適當的個人保護裝備，例如在地盤裏穿上合規格的安全鞋

- 制訂呈報、調查、跟進及分析受傷個案的制度，以評估預防措施的效用及作出所須的改善

