

減壓病

減壓病是由於身體組織中出現了氣泡所引致。在進行減壓程序時，原本在加壓狀態下溶解於血液中的氮氣氣泡，有可能突然被釋放出來而導致減壓病。減壓病最嚴重的後果可引致死亡。

病徵

關節

- 隱隱作痛
- 常見於肩部和膝部

內耳

- 眩暈
- 聽力障礙

神經系統

- 麻痺
- 抽搐
- 不省人事

其他

- 皮膚痕癢
- 視覺模糊
- 呼吸急促

氣壓傷

在加壓環境下工作，除了減壓病外，亦有可能患上氣壓傷。氣壓傷是因為氣壓改變令體內氣體體積變化而引致身體組織受損。如患有感冒或上呼吸道感染，會較容易受影響。

- **可能受影響的身體部位包括：**
 - 牙齒：因蛀牙或不良的補牙所形成的氣囊可引致牙痛
 - 鼻竇：疼痛和流鼻血
 - 耳部：耳痛、出血和耳膜穿破
 - 肺部：咳嗽、胸痛和呼吸急促

風險較高的職業

- 水肺潛水員
- 壓縮空氣中工作的人員

治療

如懷疑患上減壓病，應盡快求醫。

良好工作習慣

應該

- ✓ 遵從僱主安排，進行入職前及定期身體檢查
- ✓ 遵從氣壓室人員的指示
- ✓ 在第一次進入氣壓室時，與有經驗的壓縮空氣工作人員一同進入

- ✓ 在輪值工作期間保持足夠休息
- ✓ 補充足夠水份以免身體脫水
- ✓ 如有疼痛、不適或頭暈時，告知氣壓室人員

切勿

- × 在患上傷風、喉痛、耳痛或肺炎時，繼續在壓縮空氣中工作
- × 在壓縮空氣中工作前或期間飲酒

查詢

勞工處職業安全及健康部

電話：2852 4041

電郵：enquiry@labour.gov.hk

勞工處

職業安全及健康部

www.labour.gov.hk

勞工處職安健投訴熱線：2542 2172（所有投訴均會絕對保密）

勞工處出版 12/2013-1-OHL68